

Efekt posunu motýlích populací v důsledku klimatických změn pozorovatelný i na regionální úrovni

Autoři se pokusili zhodnotit, zda jsou změny ve výskytu motýlů v rámci nadmořské výšky konzistentní se scénáři o globálním oteplování.

Posun výskytu druhů motýlů je v rámci České republiky pozorovatelný i na regionální úrovni. Tato změna přitom neodráží žádné pevné uspořádání vztažené k různým typům habitatu či ochrannému statusu těchto druhů. Posun areálu těchto druhů je pravděpodobně ovlivněn změnou klimatu.

Využitelné výstupy:

- Mezi lety 1951-80 a 1995-2001 převládal v rámci posunu areálů druhů motýlů „vzestup“ v nadmořské výšce nad „sestupem“.
- Ze 117 druhů (Man-Whitney U-test) a 119 druhů (regrese) autoři potvrdili prokazatelný „vzestup“ posunu v rámci areálu u 15 a 12 druhů.
- Průměr a medián prokazatelného zaznamenaného posunu byl o 60 a 90 metrů (maximální zaznamenaný 148 metrů).
- Druhy, které při U-testu prokazatelně spadaly do kategorie „vzestupu“ nebyly zcela jasně spjaté s konkrétním habitatem (horská či nížinná distribuce) nebo s ochranným statutem.
- Druhy „klesající“ či „stoupající“ se s vyrovnaným zastoupením vyskytovaly v rámci všech habitatových kategoriích. Zmíněných 12-15 druhů motýlů (v závislosti na užití metodě analýzy), které „stoupají“, spadá jak mezi druhy běžné, tak ohrožené, spjaté s různými habitaty.

Grafické přílohy:  [fop_161a.jpg](#) [1]

 [fop_161b.jpg](#) [2]

Zdroj: Konvička, M., Maradová, M., Beneš, J., Frič, Z., Kepka, P., Uphill shifts in distribution of butterflies in the Czech Republic: effects of changing climate detected on a regional scale, *Global Ecology & Biogeography* (2003), 12, pp.: 403-410

Zadal: Radomír Dohnal

URL zdroje: <http://forumochranyprirody.cz/efekt-posunu-motylich-populaci-v-dusledku-klimatickych-zmen-pozorovatelnly-i-na-regionalni-urovni>

Odkazy:

[1] http://forumochranyprirody.cz/sites/default/files/fop_161a.jpg

[2] http://forumochranyprirody.cz/sites/default/files/fop_161b.jpg